

# FLAVESCENZA DORATA

## Progetto MOSCATO CUNESE – VALLI BELBO, TINELLA E BORMIDA

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2016  
contro *Scaphoideus titanus*

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:  
si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le  
piante, senza attendere la vendemmia**

**Secondo trattamento per le aziende convenzionali:  
tra il 29 luglio ed il 1 agosto**

**AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA \*** (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2014 e all'azione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

**CLOPPIRIFOS ETILE (entro il 30 luglio), CLOPPIRIFOS METILE, ETOFENPROX  
ACETAMIPRID, THIAMETHOXAM**

### **ALTRE AZIENDE: PER IL SECONDO TRATTAMENTO**

PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE:

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14
Clorpirifos etile	Fosfororganici	30
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21
Varie	Piretroidi	vari

**DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).**

### **Salvaguardia degli insetti pronubi**

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- **Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata da metcalfa nei mesi di luglio e agosto. Nel caso di presenza di melata, per evitare apicidi, è utile intervenire in precedenza con un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata.**
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### **ACCORGIMENTI**

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei cenni